

# Guna-Lympho

## STATUT PŘÍPRAVKU:

léčivý přípravek

## BALENÍ:

kapky; 30 ml lahvička

## SLOŽENÍ:

Levothyroxin  
Apis mellifica  
Calendula officinalis  
Equisetum hyemale  
Hydrastis canadensis  
Hydrocotyle asiatica  
Juglans regia  
Myosotis arvensis  
Phytolacca decandra  
Sarsaparilla  
Taraxacum officinale  
DL malic acid  
Fumaricum acidum  
Graphites  
Magnesia phosphorica  
Natrium oxalaceticum  
Natrium pyruvicum  
Trichinoyl  
Capillary tissue  
Lymphatic vessel  
Vein

## CHARAKTERISTIKA:

Guna-Lympho je přípravek fyziologické regulační medicíny s vyváženým složením, který se používá – v monoterapii i v kombinacích – při léčbě onemocnění lymfatického systému (součást detoxikační a drenážní terapie, léčba lymfedému, zánětlivá onemocnění lymfatického systému, hyperplazie lymfatických orgánů).

Jednotlivé složky se v přípravku nacházejí ve fyziologických koncentracích a přispívají různými mechanismy k dosažení požadovaného účinku:

- zlepšení proudění lymfy a stabilizace tonu žilní stěny s následným snížením exsudátu a zmenšením lymfedému (*Myosotis arvensis*, *Equisetum hiemale*, *Hydrocotyle asiatica*, *Taraxacum officinale*, *Sarsaparilla*, *Lymphatic vessel*, *Capillary tissue porcine*, *Levothyroxin*, *Vein porcine*, *DL malic acid*, *Fumaricum acidum*, *Natrium pyruvicum*, *Trichinoyl*, *Natrium oxalaceticum*);
- úprava predispozice k proliferaci lymfoepiteliální tkáně (*Hydrastis canadensis*, *Juglans regia*, *Graphites*);
- posílení imunitní obrany stimulací humorální imunity a inhibiční modulace nadměrné buněčné kompenzační odpovědi (*Magnesia phosphorica*, *Juglans regia*);
- protizánětlivý účinek na lymfoepiteliální tkáně – snížení lokálního zánětu lymfoepiteliální tkáně, zmenšení lymfatických spasmů na zánětlivém podkladu a následná obnova lymfatické cirkulace (*Calendula officinalis*, *Phytolacca decandra*, *Apis mellifica*, *Magnesia phosphorica*).

## OBLAST POUŽITÍ:

Lymfatická stáza (lymfedém); detoxikace extracelulární matrix; zánětlivá onemocnění lymfatických orgánů (lymfadenitida, lymfangitida); hyperplazie nebo hypertrofie lymfatických orgánů.

## KONTRAINDIKACE:

Přecitlivělost na látky obsažené v přípravku.

## NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Nejsou známy.

## TĚHOTENSTVÍ A LAKTACE:

Používání přípravku v období gravidity a kojení se pro nedostatek zkušeností nedoporučuje..

## VÝZNAMNÉ INTERAKCE:

Nejsou známy.

## DÁVKOVÁNÍ:

Preventivní užívání: 10 kapek 3krát denně.

Akutní fáze: 10 kapek každých 30 minut po 2–3 hodiny.

## UPOZORNĚNÍ:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučenou dávku. Doba použitelnosti se vztahuje na uchování neporušeného balení přípravku při správné teplotě, tj. od 20 °C do 25 °C.

## UCHOVÁVÁNÍ:

Při pokojové teplotě do 25 °C. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním světlem.

## VÝROBCE A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:

GUNA, Via Palmanova 69, Milano, Itálie

## INFORMACE O ZPŮSOBU VÝDEJE PŘÍPRAVKU:

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis (dle § 8 odst. 3 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.)

## INFORMACE O ZPŮSOBU HRAZENÍ Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

Není hrazen.

## Poznámka:

**Statut přípravku:** léčivý přípravek homeopatický (dle paragrafu 8, odst. 3 zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.). Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Profil vypracovala odborná redakce Edukafarm.

