

Nealergenní propolis E.P.I.D. v pediatrii – kazuistiky



Od objevení sady přípravků s nealergenním propolisem E.P.I.D., který z léčby lehčích a recidivujících respiračních infekcí úspěšně vyřazuje zbytečně předepisovaná antibiotika a zajišťuje i účinnou prevenci těchto onemocnění, uplynuly dva roky. První zkušenosti s prevapisovou řadou udělali i slovenští lékaři pro děti a dorost (PLDD), od nichž jsme obdrželi krátké kazuistiky.

MUDr. Elena Prokopová

Dětská a dorostová ambulance PROBABA, Bratislava

Kazuistika 1

- **Filip, 3 roky**
- **z anamnézy:** 2 dny horečky do 39 °C, nechce pít ani jíst.
- **obj.:** zarudlé faryngeální oblouky, četné afty, lymfatické uzliny před krčními kývacími svaly zvětšené, palpačně mírně citlivé, CRP 15 mg/l, moč. chem.: ketolátky ++.
- **diagnóza:** herpangína.
- **léčba:** Prevapis Junior ústní sprej 3–4krát denně, B komplex kv.
- **kontrola po 3 dnech:** sprej toleroval, je afebrilní, pije a jí, orof. bez zarudnutí, pouze zbytky aftů.

Kazuistika 2

- **David, 4 roky**
- **z anamnézy:** 3–4 dny suchý dráždivý kašel v opakovaných záchvatech, v noci více, afebrilní, jiné těžkosti nemá.
- **obj.:** orofarynx překrvený, dýchání drsnější nad tracheou, ostatní nález negat.
- CRP méně než 8 mg/l.
- **diagnóza:** tracheitis acuta.
- **léčba:** Prevapis Junior sirup TUS, Fenistel 3krát denně 15 kapek.
- **kontrola po 2 dnech:** dobrá snášenlivost, chuť vyhovuje, kašel produktivní, méně častý a méně intenzivní, léčba ponechána, za 4 dny bez kašle.

Kazuistika 3

- **9 dětí ve věku 2,5–3,5 roku po nástupu do kolektivu**
- **z anamnézy:** opakované infekce dýchacích cest (5krát a vícekrát během 5 měsíců) s potřebou antibiotické terapie.
- **diagnóza:** opakované infekce dýchacích cest, opakované otitidy.
- **léčba:** Prevapis Junior sirup, Prevapis Junior sáčky 3 měsíce, při infekci dvojnásobná dávka.
- **kontrola po 3 měsících:** chuť dobrá, děti tolerovaly sirup i připravený nápoj, infekty méně časté, zkrácení doby jejich trvání, zmenšení potřeby ATB terapie.

MUDr. Ivona Džupová

Dětská a dorostová ambulance, Modra

Kazuistika 1

- **chlapec, 16 let**
- **z anamnézy:** 2 dny pocítoval bolesti v krku, začínala u něj rýma, afebrilní, kašel pouze mírný.
- **obj.:** hrdlo pouze mírně zarudlé, lymfatické uzliny nehmatné.
- **doporučení:** užívat pastilky, které mu matka koupila den před návštěvou v ordinaci, a lokální ošetřování nosu.
- **kontrola za týden:** přetrvávající bolesti v krku, lok. nález beze změny, odběr TT, pacient žádá antibiotika.
- **léčba:** Prevapis Junior spray 3–4krát denně.
- **kontrola:** do dvou dnů bez bolesti a obtíží, TT negat.

MUDr. Beáta Nemčoková

Dětská a dorostová ambulance, Košice

Kazuistika 1

- **Bruno, 7 let**
- **z anamnézy:** obtíže spojené s počínající subfebrilitou, řídká vodnatá sekrece z nosu, následně bolesti v krku.



- **obj.:** DU oblouky a tonsily překrvené, farynx – sytě červené puchýřky, ostatní nález negativní.
- **diagnóza:** virová faryngitida.
- **léčba:** Prevapis Junior sirup TUS, Prevapis Junior ústní sprej, Tea tree olej roztok na kloktání, průplachy nosu s využitím Jala Néti – nosní sprchy.
- **kontrola po 4 dnech:** afebrilní, sliznice klidné, farynx taktéž, bolest v krku vymizela.

Kazuistika 2

- **chlapec F. M., 12 let**
- **z anamnézy:** bolesti v krku jak v klidu, tak při polykání, teplota 37,5 °C.
- **obj.:** v ústní dutině oblouky a tonsily zarudlé, dýchání čisté.
- **diagnóza:** pharyngitis acuta.
- **léčba:** Prevapis Junior ústní sprej 5 krát denně 2 vstříky.
- **kontrola po 3 dnech:** afebrilní, sliznice růžové, bolest v krku vymizela.

Kazuistika 3

- **děvče T. M., 5 let**
- **z anamnézy:** suchý dráždivý kašel před den i v noci, teplota 38,3 °C.
- **obj.:** ústní dutina – oblouky a tonsily hypereremické, dýchání s inspiračním stridorem, CRP 5.
- **diagnóza:** laryngitis acuta.
- **léčba:** Prevapis Junior sirup TUS 3krát 5 ml, Prevapis Junior ústní sprej 5krát denně 2 vstříky.
- **kontrola po 3 dnech:** afebrilní, kašel pouze po námaze, začala trochu vykašlávat. Ústní dutina růžová, inspirační stridor nepřítomný. Pokračování terapie do vymizení kašle. Po 5 dnech bez léčby.

Kazuistika 4

- **chlapec A. M., 8 let**
- **z anamnézy:** recidivující respirační infekty horních cest dýchacích na podzim a v zimě po nástupu do školky. Infekty jsou převážně virového původu, při symptomatické léčbě 2krát bakteriální superinfekce. Nemocen 9/2015 (nazofaryngitida virové etologie), 10/2015 (tonsilitida, CRP 52, nutná ATB terapie).
- **diagnóza:** recidivující respirační infekty horních cest dýchacích.
- **léčba:** od listopadu Gunaprevac 1krát týdně 1 tuba, Prevapis Junior sáčky 1krát denně před snídaní, 20 dní v měsíci, poté 10 dní pauza, 3 měsíce po sobě.
- **kontrola:** v únoru se maminka zastavila pro doporučení na kontrolní neurologické a psychologické vyšetření, nakolik je chlapec autistický. Od listopadu do února neměl respirační infekty.

MUDr. Alica Kubinská

Dětská a dorostová ambulance, Banská Štiavnica

Kazuistika 1

- **dívka Zuzka, 5 let**
- **z anamnézy:** příznaky akutního respiračního onemocnění s výraznou bolestí v krku.
- **obj.:** febrilní, teploty do 39 °C, bolest v krku a celého těla, v dutině ústní afity, výrazný exantém trvající 2 dny, CRP 15, na ploskách rukou i nohou erytérové vyrážky, známky virového onemocnění.
- **léčba:** antipyretika a Prevapis Junior sprej. Druhý den pocituje

dítě úlevu od bolesti, výsev na dlaních a ploskách nohou trvá, hrdlo podstatně klidnější.

- **kontrola po 5 dnech:** dítě je bez obtíží.

Kazuistika 2

- **chlapec Patrik, 7 let**
- je po chemoterapii pro akutní lymfoblastickou leukémii,
- dlouhodobě léčen antimykotiky pro soor oris (lokálně Diflucan, účinek léčby je nedostatečný),
- jako doplněk léčby použit Prevapris Junior sprej s velmi dobrým účinkem.

Kazuistika 3

- **dívka Janka, 4 roky**
- ve třech letech těžko snášela podzimní nástup do kolektivu v předškolním zařízení,
- mívala rýmy, poté opakované ušní záněty,
- v dalším roce 3 týdny před nástupem do mateřské školy jí byl podáván 12 týdnů Prevapris Junior sirup,
- adaptace proběhla bez komplikací, dítě zvládlo nástup do předškolního zařízení bez chorob (3 měsíce), do ordinace přišlo až v prosinci.

MUDr. Michal Almáši

Dětská a dorostová ambulance, Banská Bystrica

Kazuistika 1

- **chlapec Marko, 4,5 roku**
- **z anamnézy:** přiměřený PMV, navštěvuje předškolní zařízení, režimová opatření v rámci vývoje dítěte dodržovány, kvalita stavu diskutabilní (vyšší výskyt cukrů).
- **obj.:** bledší kolorit (při normálních hodnotách Fe), lehce zvýšené ukládání tuku v oblasti pasu.
- **klinický problém:** recidivující infekty horních cest dýchacích (zhruba každé 4 týdny) komplikované projevy prolongovaného kašle, opakovaně léčen ATB (především v sezónních měsících 2014/15).
- **léčba:** posílení imunity s pomocí přípravku Prevapris Junior sáčky (1 sáček denně před snídaní 20 dní), poté 10 dní pauza, opakováno v průběhu 3 měsíců. V úvodu byla podána parazitární kúra Vermoxem 2krát 1 tableta (ve 2 cyklech s odstupem 2 týdnů). Matce byla vysvětlena potřeba redukovat sacharidy ve stravě.
- **kontrola:** klinicky došlo k významnému posílení imunity, v sezónním čtvrtletí nebylo třeba podávat ATB, lehčí infekty byly zvládnuty symptomatically. Upravila se vitalita dítěte, chlapec se stal živější a aktivnější.

Kazuistika 2

- **dívka Ela, 3 roky**
- **z anamnézy:** se sestrou jsou aktuálně postiženy infektem s projevy akutní bronchitidy, léčeny ATB. Ela má tři dny suchý dráždivý kašel v záchvatech během dne, v noci méně, subfebrilie, nos volný, bez hlenů.
- **obj.:** orofarynx klidný, nos bpn, dýchání volné, bez VDF, v průběhu

vyšetření se dostavovaly záchvaty dráždivého kašle.

- **diagnóza:** kašel virový infekt DC.
- **léčba:** Prevapris Junior sirup TUS (první 2 dny při intenzivním kašli 4–5krát denně, poté 3krát denně), Thymomel sirup 3krát 2,5 ml.
- **kontrola po 3 dnech:** kašel výrazně menší intenzity, místy zvlhčený, dítě se celkově cítí silnější, má se lépe, objektivní nález beze změny. Doporučeno pokračovat v terapii přípravkem Prevapris Junior sirup TUS ještě další 3 dny.

