

# Hepatopatie



**MUDr. Zdeněk Vlasák**

praktický lékař, Saniga, s.r.o., Sokolov

*Jako hepatopatie se označují nenádorové poruchy jater, které se projevují zvýšenou aktivitou jaterních enzymů. Příčiny tohoto stavu mohou být různé, patří k nim i stavy po prodělaném zánětlivém onemocnění jater.*

## Osobní anamnéza

52letý pacient, technik. Váha 107 kg, výška 182 cm. V dětství prodělal otitidu, roce 1983 infekční hepatitidu A, v roce 1992 apendektomii. 1998 pokousán psem, antirabická vakcinace.

## Nynější onemocnění


V roce 1996 zjištěn na ultrasonografii jater přestavbový uzal v lobus quadratus. Proto provedeno CT vyšetření, nezjištěna významná porucha jater. 8/2009 zjištěna zvýšená hladina cholesterolu (5,94 mmol/l), doporučena dietní opatření. 3/2012 zjištěna hyperglykémie (10,03 mmol/l), lipidogram zcela v normě. 4/2012 kontrolní vyšetření glykémie (v normě). V listopadu 2017 při kontrole zjištěny zvýšené jaterní testy (ALT 3,09, AST 3,04, GGT 3,68 mikrokatal/l), při ultrazvukovém vyšetření jater bez patologických změn, sono epigastria – susp. sludge ve žlučníku (amorfní hmota na stěně) žlučníku.

**Diagnóza:** Hepatopatie.

**Dosavadní léčba:** Pacient neměl chronickou medikaci, 1.12.2017 nasazen přípravek Essentiale Forte (phospholipida sojae praeparata).

## Léčba FRM

12.12.2017 zahájena infuzní terapie glutathionem (**TAD-600**, 2 ampule i.v.), pokračováno 15. a 19.12.2017, dále 5.1., 26.1., 28.2. a 16.4.2018. Již po třech aplikacích došlo k poklesu hodnot jaterních testů, hodnoty klesaly dále, ve výsledku na 50% výchozích hodnot.



## Závěr

U pacienta byly na konci listopadu 2017 zjištěny zvýšené hodnoty jaterních testů (ALT, AST, GGT). Byla vyloučena hepatitida a cholecystopatie a případ charakterizován jako hepatopatie. Byla použita infuzní terapie glutathionem (přípravek **TAD-600**). Léčba vedla k výraznému poklesu hodnot jaterních enzymů.

## DOPORUČENÝ FRM PROTOKOL

**Vitamin C 7,5g i.v.**  
1x týdně

**Glutathion 600mg i.v.**  
1x týdně

**Lipo-C-Askor liq p.o.**  
2x denně 5 ml (=1g)

**Eparition p.o.**  
2x denně 1 sáček

**PŘI PRŮKAZU EBV – 2LEBV**  
obsah jedné kapsle vysypat pod jazyk; 3 měsíce

**PŘI PRŮKAZU HSV – 2LHERP**  
obsah jedné kapsle vysypat pod jazyk; 3 měsíce

**GUNA-LIVER**  
2x denně 3 pelety

**EPAVIN**  
2x20 kapek

