

JAK PACIENTI VNÍMAJÍ LÉČBU GENERICKÝMI LÉČIVY


Pohled portugalské populace na léčbu generickými léčivými byl publikován v časopise *Pharmacy world & science*. Cílem této práce bylo zjistit vliv vnímání závažnosti onemocnění na volbu mezi léčivými originálními či generickými. Dále byly sledovány socio-demografické parametry. Jako modelová onemocnění různého stupně závažnosti byly zvoleny chřipka, astma a angina pectoris. Tato onemocnění jsou v Portugalsku dobře známá a na farmaceutickém trhu se vyskytují generická léčiva pro tato onemocnění.

Dotazník vyplnilo 1 278 Portugalců starších 18 let. Údaje byly sbírány v rozmezí 4 týdnů. Otázky byly kladeny následně: *“Představte si, že vám bylo*

Mgr. Lucie Kotlářová
Edukafarm, Praha

V mnoha zemích jsou národními zdravotními autoritami preferována generická léčiva, a to z ekonomických důvodů. Zajímavý je však pohled samotných pacientů na léčbu generickými léčivými – pohled, do kterého se promítají očekávání a míra důvěry v tuto léčiva. Pohled na generická léčiva očima pacientů se liší v závislosti na pohlaví, vzdělání a věku.

Míra souhlasu s preskripcí generik ve vztahu k různým typům onemocnění (n=1125)



3,21). *Mladší a vzdělanější účastníci měli větší důvěru v účinnost generických léčiv, zatímco starší účastníci věřili více v podobnost generického léčiva a jeho originální předlohy.*

Z hlediska souhlasu pacienta léčit se generickými léky u konkrétních onemocnění průzkum prokázal, že *míra souhlasu s léčbou generickými léčivými se snižovala s mírou vnímání závažnosti onemocnění (chřipka = 4,07, astma = 3,95, angina pectoris = 3,89).*

ZÁVĚR

Studie ukázala, že účastníci průzkumu obecně věří, že generická léčiva jsou účinná a podobná originálním lékům. Dále průzkum ukázal, že míra souhlasu s užíváním generických léčiv je signifikantně nižší u onemocnění, která jsou vnímána jako více závažná. Toto zjištění odpovídá výsledkům předchozích průzkumů, kdy účastníci vnímali levnější léčbu závažných onemocnění jako méně účinnou. To může sehrát svou negativní roli v primární péči, jelikož může být pro lékaře těžší přesvědčit pacienta o vhodnosti léčby generickým léčivem, pokud pacient vnímá své onemocnění jako závažné.

Literatura

Figueiras M. People's views on the level of agreement of generic medicines for different illnesses. *Pharm World Sci* 2008;30:590–594.

CO JIŽ JE O DANÉ PROBLEMATICE ZNÁMO:

- ✓ Používání generických léčiv je preferováno z důvodu snížených nákladů na léčbu.

CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ TENTO ČLÁNEK K DANÉ PROBLEMATICE:

- ✓ Vnímání léčby generickými léčivými pacientem je obecně pozitivní.
- ✓ Míra souhlasu s léčbou generickými léčivými se snižuje s mírou vnímání závažnosti onemocnění.
- ✓ Mladší a vzdělanější pacienti mají větší důvěru v účinnost léčby generickými léčivými.

	Škála	Vzdělání		
		9 let	12 let	Univerzitní
Účinnost	1–5	3,6	3,78	3,94
Podobnost	1–5	3,28	3,23	3,25
Věk				
		18–25 let	26–37 let	> 38 let
Účinnost	1–5	3,84	3,80	3,72
Podobnost	1–5	3,14	3,26	3,25

Tabulka 1 Rozdíly ve vnímání účinnosti generického léčiva a podobnosti generického léčiva s originálním léčivem v závislosti na vzdělání a věku (n = 1125).

	Škála	Chřipka	Astma	Angina pectoris
Pohlaví				
Muži	1–5	4,05	3,97	3,89
Ženy	1–5	4,07	3,93	3,89
Věk				
18–25 let	1–5	4,06	3,93	3,87
26–37 let	1–5	4,08	4,00	3,94
> 38 let	1–5	4,05	3,91	3,87
Vzdělání				
9 let	1–5	3,86	3,73	3,72
12 let	1–5	4,04	3,91	3,83
Univerzitní	1–5	4,22	4,11	4,06

Tabulka 2 Míra souhlasu s léčbou generickými léčivými v závislosti na pohlaví, věku a vzdělání (n = 1125).

diagnostikováno (vybrané onemocnění) a předepsána generická léčiva. Prosím, zvolte na škále 1–5 míru souhlasu s generickou léčbou.“ Odpovědi byly hodnoceny podle pětibodové Likertovy škály (1 = velmi silně nesouhlasím, 2 = nesouhlasím, 3 = nejsem si jistý, 4 = souhlasím, 5 = velmi silně souhlasím).

Dále byly sledovány socio-demografické údaje, jako je věk, pohlaví a úroveň vzdělání.

Celkem bylo zpracováno 1 125 správně vyplněných dotazníků, z respondentů bylo 61 % žen a 39 % mužů. Průměrný věk tazatelů byl 33 let. 36 % účastníků průzkumu mělo dokončenu 12letou školní docházku a 35 % mělo univerzitní vzdělání.

Výsledky průzkumu ukázaly, že účastníci měli pozitivní očekávání, pokud se týče účinnosti generických léčiv (průměr 3,83) a generiku přisuzovali značnou podobnost s originálním léčivem (průměr